

# 細井硫黄粉剤50

殺菌剤

登録番号 第3725号

- 有効成分 硫黄……50.0%
- 性状 淡黄色粉末 45 $\mu$ m以下
- 毒性 普通物
- 有効年限 5年
- 包装 ダンボール(3kg入りクラフト紙×8袋)

## 《特長》

1. 散布用の微粉粉剤で、水の制約を受けない為、水の不便な所でも使用が容易です。
2. さび病やうどんこ病に殺菌作用をもち、同時にハダニにも殺菌効果があります。
3. 有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。

## 【適用病害及び使用方法】

作物名	適用病害虫	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
野菜類 豆類(種実) いも類	うどんこ病 ハダニ類	3kg/10a	—	—	散布	—
かんきつ	ハダニ類					
麦類	うどんこ病 さび病					
らっかせい	黒渋病 褐斑病					
宿根かすみそう	うどんこ病					
キンセンカ	うどんこ病					
大粒種ぶどう (施設栽培)	すす点病		果粒幼果期～ 軟化期			
たばこ	うどんこ病		移植前		土壌表面散布	

## 【使用上の注意事項】



## 【安全使用上の注意事項】

1. 散布の際は、マスク、手袋などして粉末を吸い込んだり、多量に浴びたりしないように注意し、作業後は顔、手足などの皮膚の露出部を石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
2. 密閉した場所での使用は、火気等により粉塵爆発の危険性があるので十分注意して下さい。
3. 本剤の有効成分は危険物第2類に属するので、火気には十分注意して下さい。

## 【薬害等 使用上の注意事項】

1. 高温時(28℃以上)散布は薬害を生じるおそれがあるので避けて下さい。
2. 日本なし、うり類(すいか、きゅうり、まくわうり等)は薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意して下さい。
3. きんせんかに使用する場合は、葉及び花卉に汚れを生じるおそれがあるので、出荷直前の散布は避けて下さい。
4. 大粒種ぶどう(施設栽培)のすす点病に使用する場合は、マスカット・オブ・アレキサンドリア及びグローコールマン以外の品種では薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して下さい。
5. たばこのうどんこ病防除に使用する場合、茎葉にかかると品質への影響があるので、移植後の使用はさけ整地後移植前に使用して下さい。  
なお、本使用方法是病原菌の密度を低下させる目的で使用するので、前年作でうどんこ病が多発し、本年作に発生するおそれのある圃場での使用を主体として下さい。
6. 本剤は蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにして下さい。
7. 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用して下さい。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けて下さい。

## 【保管上の注意事項】

1. 火気をさけ、直射日光の当たらないなるべく低温で乾燥した場所に密封し、食品と区別して保管して下さい。  
特に湿気を吸ったりすると、その物理的性状が劣化するので湿気には十分注意して保管して下さい。  
危険物第2類に属するので、火気には十分注意して下さい。
2. 100kg以上保管する場合は、消防法(危険物第2類)の規制に適應した倉庫に保管して下さい。
3. 火をつけたり、火の中に投入すると有毒・有害なガスを発生するので十分注意して下さい。
4. 空袋は圃場などに放置せず、適切に処理して下さい。